

Administração de Ferro Endovenoso

Guia para o cliente e família

O ferro endovenoso é um medicamento administrado através da punção de uma veia, utilizado para repor ou aumentar os níveis de ferro no organismo e, desta forma, tratar a anemia. Está indicado quando o tratamento com ferro em forma de comprimidos não é eficaz ou quando os níveis de ferro estão muito abaixo dos níveis-padrão e há necessidade de uma reposição rápida e segura.

ANTES DO TRATAMENTO

Deve trazer a sua prescrição médica e informar o profissional de saúde se:

- Está doente ou apresenta alguma infecção aguda;
- Tem alguma alergia medicamentosa;
- Está a tomar ferro em comprimidos, cápsulas ou similar.

DEPOIS DO TRATAMENTO

Após o tratamento, deve permanecer no serviço cerca de 20/30 minutos, para vigilância de possíveis reações, tais como:

- Alterações na pele, como comichão e vermelhidão;
- Inchaço dos lábios, língua, boca ou rosto;
- Sensação de garganta fechada;
- Dificuldade respiratória;
- Alterações na tensão arterial;
- Dores musculares;
- Dores de cabeça;
- Má disposição persistente.



RECOMENDAÇÕES

- É recomendado que não faça esforços com o membro que foi punccionado.
- Se no local da injeção identificar rubor, calor, hematoma ou dor deverá aplicar gelo, cerca de 15 minutos, várias vezes ao dia.
- Se surgir alguma reação adversa tardia, como febre por exemplo, deve contactar o seu médico ou dirigir-se ao Serviço de Urgência mais próximo.